

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. De verschijnselen verschillen per persoon en per ziekte.

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten en/of ideeën niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal; er kunnen problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Met het erger worden van de ziekte krijgt de persoon met dementie steeds meer moeite om duidelijk te maken wat hij bedoelt en om anderen te begrijpen.

Een spraakstoornis betreft alleen de spraak. Woorden en zinnen worden niet goed of niet duidelijk uitgesproken.

Wat doet de logopedist

De logopedist neemt een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek af. Daarnaast observeert de logopedist hoe de persoon met dementie communiceert met de mensen in zijn omgeving. Afhankelijk van de diagnose die de logopedist stelt, wordt er een logopedische behandeling gestart. In de behandeling zal alles er op gericht zijn om de communicatie tussen de cliënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie over taal- en spraakstoornissen bij dementie:

- www.hersenletsel.nl
- www.hersenstichting.nl
- www.alzheimer-nederland.nl