

## Pijnmedicatie

- Zo nodig 3x 50 mgr. Meloxicam tablet of zetpil per 24 uur
- Zo nodig 2x 500 mgr. Naproxen tablet of zetpil per 24 uur
- Zo nodig 6x 500 mgr. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur
- Zo nodig 4x 1000 mgr. Paracetamol tablet of zetpil per 24 uur

## Antibiotica

- Gedurende één week 3x daags 625 mg. Augmentin
- Gedurende één week 3x daags 600 mg. Clindamycine

## Leefregels

Het is belangrijk om regelmatig te plassen, ten minste vijf keer per dag. Als u pijn heeft bij het urineren of u moet vaak kleine beetjes urineren, neem dan contact op met uw huisarts. U heeft dan waarschijnlijk een blaasontsteking.

Bij de TVT-O kunt u gedurende enige weken last van de liezen hebben. De eerste weken kunt u soms nog ongewild urineverlies hebben.

De eerste twee weken is het belangrijk om niet zwaar te tillen; geen kinderen tillen, geen zware boodschappentassen dragen en geen zwaar werk doen.

Douchen mag. Wacht met het nemen van een bad tot de bloederige afscheiding uit de vagina gestopt is.

Gebruik de eerste vier weken na de operatie geen tampons. Wacht na de operatie vier weken met seksuele gemeenschap. Autorijden mag.

## Ontslagbrief

De ontslagbrief wordt digitaal naar uw huisarts verzonden.