



SHOCKWAVE THERAPIE

Beatrixziekenhuis
Afd. C-0
Banneweg 57
4204 AA
GORINCHEM

SHOCKWAVE THERAPIE

AFSPRAAK MAKEN

U kunt met ons direct een afspraak maken voor een consult bij de fysiotherapeut. Hiervoor kunt u iedere werkdag bellen naar: (0183) 64 43 92.

Er wordt geprobeerd om u zo spoedig mogelijk in te plannen. Bent u onder behandeling vanuit het Beatrixziekenhuis dan wordt er in overleg met uw fysiotherapeut een afspraak ingepland.



Rivasfysiotherapie



Rivasfysiotherapie



Rivasfysiotherapie

FYSIOTHERAPEUTEN



Mariska



Valeria



Hanneke



Daan



Jan



SHOCKWAVE

Heb je een van de volgende klachten?

- Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting
- Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
- Pijn net onder de knieschijf
- Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
- Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
- Spasticiteit
- Andere vormen van tendinopathiën

Dan kan shockwave-therapie wellicht een oplossing voor je zijn!



WAT IS DE WERKING VAN SHOCKWAVE?

Een pees wordt op microscopisch en cellulair niveau beïnvloed, wat de lokale stofwisseling en doorbloeding stimuleert en de zelfherstellende eigenschappen van het lichaam activeert.

WAT ZIJN DE RESULTATEN

Het pijnstillende effect is direct na de behandeling merkbaar. Het geïnitieerde herstelproces verloopt echter geleidelijk en kan pas na vier weken definitief worden beoordeeld.

HOE ZIET EEN BEHANDELING ER UIT?

Allereerst wordt het pijngebied gelokaliseerd op basis van een lichamelijk onderzoek en, indien nodig, door middel van echografie. Vervolgens wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte shockwave-impulsen. De intensiteit en duur van de behandeling zijn afhankelijk van de aard van de klachten.

ZIJN ER BIJWERKINGEN?

In de wetenschappelijke literatuur zijn er geen bijwerkingen beschreven. Na de behandeling kan er echter lokale roodheid of een kleine bloedingstorting optreden. Sommige mensen ervaren een tijdelijke toename van pijnklachten.

WAT ZIJN DE CONTRAINDICATIES?

Shockwave-therapie wordt niet toegepast in de volgende gevallen:

- Bij aanwezigheid van peesscheuren
- Wanneer zich metaal in de nabijheid bevindt, bijvoorbeeld na de plaatsing van een kunstgewricht of botfixatie
- In geval van zwangerschap

